



عنوان : مراجعة الفرض التأليفي الأول

تمرين ع-1-د

تمثل الوثيقة التالية 3 منحنيات بيانية تبرز تغير شدة التركيب الضوئي عند نبات أخضر مائي بحسب 3 عوامل أساسية .




1 - بالاعتماد على المنحنيات البيانية رتب شدة التركيب الضوئي تصاعديا في مستوى النقاط الأربعة (أ) و (ب) و (ج) و (د) .



2 - عمر الجدول التالي بما يناسب للكشف عن العامل المتسبب في الفارق في شدة التركيب الضوئي بين النقاط الأربعة (أ) و (ب) و (ج) و (د) .

العامل المسؤول عن الفارق	الفارق في شدة التركيب الضوئي
الإضاءة	بين النقطة (أ) والنقطة (ب)
الحرارة	بين النقطة (ب) والنقطة (ج)
نسبة ثاني أكسيد الكربون	بين النقطة (ب) والنقطة (د)



تمرين عدد 2

انتقي من المصطلحات الموجودة في الإطار ما يناسب لتملأ الفراغات الواردة بالفقرة التالية واحذر المصطلحات الدخيلة :

التركيب الضوئي - الأوعية اللحاءية - النسغ الخام - الأوبار الماصة - اليخضور - أكسجين - ضوء - الأوعية الخشبية - ثاني أكسيد الكربون - ذاتي التغذية - النسغ الجاهز

- يمتص النبات الأخضر بواسطة **الأوبار الماصة** للجذور الماء والأملاح المعدنية التي تكون **النسغ الخام** وينقل هذا النسغ إلى كافة أجزاء النبات (الأرضية والهوائية) عبر **الأوعية الخشبية** الناقلة .


- يلتقط النبات الأخضر الضوء بواسطة **اليخضور** ويمتص **ثاني أكسيد الكربون** من الهواء الجوي فيقوم بعملية **التركيب الضوئي** التي يصنع خلالها المواد العضوية مثل النشا فهو إذا كان منتج **ذاتي التغذية** .

- يمكن تلخيص عملية التركيب الضوئي كمايلي :



تمرين عدد 3

لمعرفة التبادلات الغازية عند النبات الأخضر في الليل أنجز أحد التلاميذ التجربة المجسّمة بالرسم التالي :



وبعد مدة زمنية لاحظ النتائج التالية : - تعكر ماء الجير وانطفاء الشمعة .



1 - أذكر سبب انطفاء الشمعة .

سبب انطفاء الشمعة نفاذ الأكسجين داخل الناقوس .

2 - أذكر سبب تعكر ماء الجير .

سبب تعكر ماء الجير ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون داخل الناقوس .

3 - استنتج التبادلات الغازية للنبات الأخضر في الليل .


استنتاج : قامت النبتة الخضراء في الليل بامتصاص الأكسجين وطرح ثاني أكسيد الكربون .

تمرين عدد

تمت متابعة المردود الزراعي لنبات الطماطم حسب كتلة السماد المستعملة مثلما يبيّنه الجدول التالي :

350	300	250	200	150	100	50	0	كمية السماد : كلغ/هكتار
20	26	30	31	30	25	20	10	الإنتاج : قنطار/هكتار

يمثل المنحنى البياني التالي علاقة إنتاج الطماطم بكمية السماد المستعملة .



1 - حل المنحنى البياني .

التحليل : يبيّن المنحنى البياني وجود 3 مناطق مختلفة :

المنطقة (أ) : منطقة عوز : كمية السماد لا تفي بحاجة النبات مع إمكانية مشاهدة مظاهر النقص .

المنطقة (ب) : منطقة مثلى : كمية السماد كافية وملائمة للحصول على إنتاج وفير .

المنطقة (ج) : منطقة تسمّم : كمية السماد ضارة مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاج .



2 - ماذا تستنتج ؟

نستنتج أن النبات الأخضر يحتاج إلى الأسمدة المعدنية بمقادير مناسبة تمكّن من زيادة المردود الزراعي .


3 - أستخرج من المنحني البياني كمية السماد المثلى التي تعطي أحسن مردود زراعي لإنتاج الطماطم .

كمية السماد المثلى التي تعطي أحسن مردود زراعي لإنتاج الطماطم تتراوح بين 150, 200 قنطار في الهكتار .

تمرين 5-د

للكشف عن شروط صنع النشا في مستوى أوراق نبتة خضراء أنجزنا مجموعة من التجارب أجريت على 4 أوراق في ظروف تجريبية مختلفة مجسّمة في الجدول التالي :

ظروف التجربة	نتيجة الكشف عن النشا في الأوراق	الإستنتاج
1 - ورقة عادية معرّضة للضوء وفي هواء عادي . 	تلون الورقة بالأزرق	تحتوي الورقة على النشا
2 - ورقة معرّضة للضوء وفي هواء عادي لكن وضعنا على جزء منها حجاب أسود . 	عدم تلون الجزء المحجوب بالأزرق وتلون الجزء المتبقي	الضوء عنصر ضروري لصنع النشا
3 - ورقة مرقطة معرّضة للضوء وفي هواء عادي . 	عدم تلون المنطقة المرقطة بالأزرق وتلون المنطقة التي تحتوي على اليخضور	اليخضور مادة ضرورية لصنع النشا



4 - ورقة عادية معرّضة للضوء وفي هواء ينعدم فيه ثاني أكسيد الكربون .

عدم تلون الورقة بالأزرق

ثاني أكسيد الكربون عنصر ضروري لصنع النشا




1 - استنتج لكل تجربة في الخانة المناسبة .

2 - استنتج شروط صنع النشا في مستوى أوراق النبات الأخضر .

شروط صنع النشا في مستوى أوراق النبات الأخضر : الضوء واليخضور وثاني أكسيد الكربون

تمرين عدد

بيّنت البحوث التي أجريت على امتداد سنتين على حقل من القمح مساحته 4 هكتارات اختلافا في منتوج حبوب القمح باختلاف مصادر الري كما يبيّنه الرسم البياني التالي :



1 - أحسب معدّل إنتاج الحبوب بالطن في الهكتار الواحد في السنة الأولى وفي السنة الثانية .

السنة الأولى (مياه الأمطار فقط) : معدّل إنتاج الحبوب = 6 طن ÷ 4 هكتار = 1.5 طن / هكتار

السنة الثانية (مياه الأمطار + الري التكميلي) : معدّل إنتاج الحبوب = 10 طن ÷ 4 هكتار = 2.5 طن/هكتار




2 - قارن النتائج المتحصّل عليها في السؤال الأول . ماذا تستنتج ؟

مقارنة : زراعة الحبوب بأعتماد الري بمياه الأمطار والري التكميلي نلاحظ ارتفاع إنتاج حبوب القمح 2.5 طن/هكتار بينما عند الري بمياه الأمطار فقط إنتاج الحبوب 1.5 طن/هكتار .

استنتاج : الري التكملي له أهمية في تحسين الإنتاج النباتي .

تمرين عد7-د

للتعرف على تأثير الحرارة على شدّة التركيب الضوئي عند نبتة البطاطا تمّت مراقبة وقياس كمية ثاني أكسيد الكربون الممتصّة في ظروف حرارية مختلفة ثم تمّ رسم المنحني البياني .



المنحني البياني لكمية ثاني أكسيد الكربون الممتصّة حسب تغير درجة الحرارة

1 . حلل المنحني البياني وبيّن تأثير تغير درجة الحرارة على كمية ثاني أكسيد الكربون الممتصّة من قبل نبتة البطاطا .

التحليل : يقسم المنحني البياني إلى منطقتين :

المنطقة (أ) : منحني تصاعدي كلما أرتفعت درجة الحرارة زادت كمية ثاني أكسيد الكربون الممتصّة تمتد من درجة حرارة 0 إلى درجة حرارة 30 .

المنطقة (ب) : منحني تنازلي كلما أرتفعت درجة الحرارة تنخفض كمية ثاني أكسيد الكربون الممتصّة ، تمتد درجة حرارة أكبر من 30 درجة .

2 . حدّد درجة الحرارة المثلى لامتصاص الكمية المناسبة لثاني أكسيد الكربون للحصول على أحسن إنتاجية لنبات البطاطا .



تمرين 8-د

تم إنجاز تجارب على نباتات مختلفة وتحديد مجال الحرارة المثلى للحصول على أحسن إنتاجية كما يبينه الجدول التالي :

مجال الحرارة المثلى درجة مئوية (°C)	نوع النبات
20 – 15	قمح – شعير
30 – 20	بطيخ – دلاءع
35 – 25	ذرة – عباد الشمس

- فسر لماذا لا يمكن للفلاح إنتاج أي نوع من النبات على مدار السنة .
- صنّف النباتات المبينة في الجدول حسب الفصول الملائمة للحصول على إنتاجية عالية .

تمرين 9-د

للتعرّف على تأثير ثاني أكسيد الكربون على شدة التركيب الضوئي عند نبات القمح تمت مراقبة وقياس شدة التركيب الضوئي في وسط متغير النسبة المئوية لثاني أكسيد الكربون ثم تم رسم المنحني البياني .



المنحني البياني لشدة التركيب الضوئي حسب

النسبة المئوية لثاني أكسيد الكربون في الهواء المحيط

- حلّل المنحني البياني وبيّن تأثير النسبة المئوية لثاني أكسيد الكربون على شدة التركيب الضوئي وبالتالي على تحسين الإنتاجية في نبات القمح .
- حدد النسبة المئوية المثلى لثاني أكسيد الكربون للحصول على أحسن إنتاجية لنبات القمح .
- فسر محدودية الإنتاج النباتي عندما تكون النباتات معرّضة للهواء العادي المحتوي على 0.03% من ثاني أكسيد الكربون .



تمرين عـ10ـد

تمت زراعة بذور نبات الفجل تجريبيا في المخبر تحت نواقيس بلاستيكية شفافة (15 بذرة كتلتها 0.14 غ تحت كل ناقوس) وقد تمت المحافظة على نفس ظروف الإضاءة والحرارة والتغذية المعدنية مع تغيير نسبة ثاني أكسيد الكربون كما يلي :

نسبة عادية في الناقوس الأول ، نسبة ضعيفة في الناقوس الثاني ، نسبة عالية جدا في الناقوس الثالث .

بعد 20 يوم تم جني النباتات المتحصّل عليها ثم تجفيفها ووزنها فكانت النتائج كما يلي :

نباتات تحت الناقوس	1	2	3
الكتلة الجافة (غ)	2.62	0.39	3.10

1. قارن الكتل المتحصّل عليها تحت كل ناقوس .
2. ابحث عن العلاقة بين النتائج التجريبية والطريقة العملية الميدانية التي تساهم في زيادة الإنتاج في البيوت المكيفة .

